

# FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES



FASCÍCULO 52

FAMILIA VITTARIACEAE

Por Mónica Palacios-Rios

Instituto de Ecología A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Pátzcuaro, Michoacán, México  
en colaboración con



CONACYT



1997



CONABIO

La Flora del Bajío y de regiones adyacentes pretende ser básicamente un inventario de las especies de plantas vasculares que crecen en forma silvestre en los estados de Guanajuato, de Querétaro y en la parte septentrional de Michoacán. En este último quedan incluidas las áreas ubicadas al este del paralelo 102° 10' W y al norte del parteaguas de la cuenca del río Balsas.

La Flora es un esfuerzo cooperativo, crítico, coordinado por el Instituto de Ecología, en el que participarán investigadores del mismo, así como de otros organismos nacionales y algunos extranjeros.

La Flora se edita en forma de fascículos sin secuencia preestablecida. Cada fascículo corresponde en principio a una familia. Además, se edita una serie paralela de fascículos complementarios, que dan cabida a temas ligados al universo vegetal del área, pero que no serán propiamente contribuciones taxonómicas.

Editores: Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón de Rzedowski.

Producción Editorial: Rosa Ma. Murillo.

Toda correspondencia referente a la adquisición de fascículos o canje debe dirigirse a:

Instituto de Ecología A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Apdo. Postal 386  
61600 Pátzcuaro, Michoacán

Este fascículo se publica gracias al apoyo económico recibido de:

- el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
- la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
- el Sr. Walter L. Meagher

ISSN 0188-5170

ISBN 968-7863-04-8

# FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES

Fascículo 52

mayo de 1997

## VITTARIACEAE\*

Por Mónica Palacios-Rios\*\*

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, Veracruz

Plantas por lo general epífitas, rara vez terrestres; rizoma corto y erecto a largo y rastrero, densamente escamoso, escamas fuertemente clatradas, a menudo iridiscentes, angostamente lanceoladas, con frecuencia largamente atenuadas en el ápice, por lo general concoloras, rizoma con abundantes raíces densamente cubiertas con tricomas largos; tallo casi erecto a rastrero, pequeño o largo y bastante delgado, escamoso, no endurecido; hojas de 3 cm a 1 m de largo, simples y enteras a furcadas o pinnadas, brotes circinados, pecíolos sin estípulas; soros (sin conformarse en el caso de *Anetium*) a menudo en grupos en y entre las venas y la superficie de la lámina, exindusiados; esporangios dispuestos en el envés de la lámina, a menudo hundidos, muy cortamente pedicelados, el pedicelo ubicado 1 a 2 filas abajo de su ápice, el anillo vertical interrumpido por el pedicelo, homósporos; esporas sin clorofila; gametofito epígeo, con clorofila, alargado, en ocasiones irregularmente ramificado, algunas veces sin brotes; arquegonios esparcidos en la superficie inferior hacia los márgenes; anteridios formados por tres células, naciendo en la superficie inferior, en su mayoría alejados de los arquegonios.

Familia filogenéticamente algo aislada, constituida por un grupo muy natural de helechos leptosporangiados, bien adaptados al hábito epifítico y con estructuras notablemente simplificadas. Comprende seis géneros y alrededor de 100 especies distribuidas en las regiones de clima cálido del Globo. Algunos autores consideran a este grupo como subfamilia de Adiantaceae.

---

\* Referencias: Benedict, R. C. A revision of the genus *Vittaria* J. E. Smith. Synopsis of the subgenera and the American species. Bull. Torr. Bot. Club 41: 391-410. 1907.

Mickel, J. T. & J. M. Beitel. Pteridophyte flora of Oaxaca. Mem. New York Bot. Gard. 46: 246-249. 1988.

Smith, A. R. Pteridophytes. Flora of Chiapas 2: 245-246 1981.

Tryon, R. M. & A. F. Tryon. Ferns and allied plants with special reference to tropical America. Springer-Verlag. New York. pp. 134-138. 1982.

\*\* Trabajo realizado con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt-NSF Primavera'93 1360-N9206), de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio-F012) y del Instituto de Ecología, A.C. (902-14).

El único género que se encuentra representado en la región de esta Flora es *Vittaria*, que destaca por su hábito epifítico, en combinación con escamas del rizoma clatradas, así como hojas simples, enteras y colgantes.

### VITTARIA J. E. Smith

Plantas por lo general epífitas, con rizoma pequeño, erecto a rastrero, con escamas oscuras, a menudo iridiscentes, fuertemente clatradas; hojas agrupadas, lineares, enteras, con o sin pecíolo corto, venas formando una a varias hileras de areolas entre la costa y la vena fértil submarginal, pero inmersas y no muy evidentes, tejido de la lámina glabro, subcoriáceo a coriáceo; esporangios algo hundidos, dispuestos en una línea a ambos lados de la costa, exindusiados, parafisos presentes, numerosos en el surco soral submarginal, lineares a clavados, multicelulares; esporas bilaterales y monoletes o tetraédricas y triletes, hialinas a usualmente amarillentas en la madurez, aparentemente sin perina obvia; gametofitos filamentosos.

El género *Vittaria* se encuentra ampliamente distribuido en los trópicos y cuenta con cerca de 50 especies, de las cuales aproximadamente 12 se distribuyen en América; una de ellas se ha colectado en nuestra área de estudio.

***Vittaria graminifolia*** Kaulf., Enum. Fil. p. 192. 1824. *V. filifolia* Fée, Mém. Foug. 3: 20. 1851-1852.


Planta epífita (o a veces epipétrica) con rizoma horizontal, compacto, de 1 a 1.5 mm de diámetro, provisto de escamas clatradas, de 4 a 5 mm de largo, de 0.8 a 1.3 mm de ancho, uniformes en tamaño y tipo de células, de dos células de ancho solamente a nivel de las 3 ó 4 células del ápice, de 8 a 20 células de ancho en la base; hojas de hasta 30 cm de largo, de 1.5 a 2 mm de ancho en el punto más ancho, de 1 a 1.5 mm de ancho en la base, margen no recurvado, vena media no evidente en ambas superficies, el envés aplanado entre los soros, parafisos fuertes, de 0.1 mm de largo, rojo-parduscos a más oscuros, con la célula apical alargada, ovada, dos veces más larga que ancha; esporas tetraédrico-globosas, triletes, claras, incoloras a amarillentas.

Se encuentra escasamente representada en nuestra zona de estudio, prosperando en cañadas y orillas de arroyos, con vegetación de bosque mesófilo de montaña. Alt. 1600-2200 m.


Distribuida desde las cadenas montañosas más húmedas de México hasta Brasil. Tamps., S.L.P., Qro., Hgo., Jal., Mich., Méx., Mor., Pue., Ver., Gro., Oax., Chis.; Centroamérica; Sudamérica (tipo procedente de Brasil: *A. Otto s. n.* (LZ, destruido), isotipo en E); las Antillas (lectotipo de *V. filifolia*, procedente de la Isla de Guadalupe: *F. L. L'Herminier s. n.* (P)).

En nuestra área esta planta es muy escasa y en consecuencia vulnerable a la extinción. Sin embargo, en otras regiones suele ser más frecuente.





*Vittaria graminifolia* Kaulf. A. aspecto general de la planta; B. escama del rizoma; C. corte transversal de una hoja fértil; D. espora. Ilustrado por Edmundo Saavedra.



**Querétaro:** Cañada las Avispas, al SE de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan, *H. Díaz y E. Carranza 6554* (IEB); Joya del Hielo, municipio de Landa, *H. Díaz y E. Carranza 6633* (IEB).

**Michoacán:** Cerro Azul, municipio de Morelia, *G. Arsène 5185* (MEXU); Cerro Azul, près Morelia, municipio de Morelia, *G. Arsène 5252* (US); Agua Zarca, municipio de Morelia, *U. Guzmán s. n.*, 29.VI.1991 (IEB).

*Vittaria graminifolia* es muy parecida a *V. dimorpha* K. Müller, de la cual se distingue por tener la lámina de la hoja recta a falcada, plana en el envés, con márgenes no recurvados, escamas del rizoma uniformes, usualmente de 8 a 20 células de ancho en la base, con un ápice corto de 3 ó 4 células de largo, éstas de pared

celular uniforme, parda clara, así como por habitar en elevaciones medias a altas, a diferencia de *V. dimorpha*, que tiene la lámina foliar falcada, con la vena media resaltada en el envés, los márgenes recurvados, escamas del rizoma dimórficas, algunas angostas, de 2 células de ancho en la base, otras anchas, de 10 a 12(15) células de ancho y con un ápice largo, uniseriado, de paredes celulares a menudo dimórficas, todas pardas oscuras y gruesas o las centrales pardas más oscuras y más gruesas, y además habita en elevaciones bajas a medias.

*V. graminifolia* y *V. dimorpha* se encuentran con mayor frecuencia en México y Centroamérica, a diferencia de *V. lineata* (L.) J. E. Smith, que es más común en las Antillas y a menudo en Sudamérica (Mickel y Beitel, op. cit.).

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

Adiantaceae, 1

*Anetium*, 1

*Vittaria*, 2

*V. dimorpha*, 4, 5

*V. filifolia*, 2

*V. graminifolia*, 2, 3, 4, 5

*V. lineata*, 5

Vittariaceae, 1





I

II

III

## MUNICIPIOS DE GUANAJUATO    MUNICIPIOS DE QUERÉTARO    MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

32 Abasolo  
 43 Acámbaro  
 30 Apaseo El Alto  
 29 Apaseo El Grande  
 7 Atarjea  
 28 Celaya  
 27 Comonfort  
 45 Coroneo  
 36 Cortazar  
 21 Cuerámbaro  
 14 Doctor Mora  
 11 Dolores Hidalgo  
 10 Guanajuato  
 33 Huanímbaro  
 22 Irapuato  
 35 Jaral del Progreso  
 44 Jerécuaro  
 25 Juventino Rosas  
 8 León  
 19 Manuel Doblado  
 38 Moroleón  
 1 Ocampo  
 31 Pénjamo  
 23 Pueblo Nuevo  
 17 Purísima del Rincón  
 20 Romita  
 24 Salamanca  
 41 Salvatierra  
 3 San Diego de la Unión  
 2 San Felipe  
 18 San Francisco del Rincón  
 13 San José Iturbide  
 4 San Luis de la Paz  
 12 San Miguel de Allende  
 16 Santa Catarina  
 40 Santiago Maravatío  
 9 Silao  
 46 Tarandacuao  
 42 Tarimoro  
 15 Tierra Blanca  
 39 Uriangato  
 34 Valle de Santiago  
 5 Victoria  
 26 Villagrán  
 6 Xichú  
 37 Yuriria

18 Amealco  
 1 Arroyo Seco  
 11 Cadereyta  
 9 Colón  
 8 El Marqués  
 12 Ezequiel Montes  
 15 Huimilpan  
 2 Jalpan  
 3 Landa  
 16 Pedro Escobedo  
 4 Peñamiller  
 5 Pinal de Amoles  
 7 Querétaro  
 6 San Joaquín  
 17 San Juan del Río  
 13 Tequisquiapan  
 10 Tolimán  
 14 Villa Corregidora

53 Acuitzio  
 24 Álvaro Obregón  
 9 Angamacutiro  
 32 Angangueo  
 36 Coeneo  
 28 Contepec  
 21 Copándaro de Galeana  
 22 Cuitzeo  
 40 Charo  
 34 Cherán  
 33 Chilchota  
 19 Chucándiro  
 6 Churintzio  
 5 Ecuandureo  
 27 Epitacio Huerta  
 47 Erongarícuaro  
 20 Huandacareo  
 18 Huaniqueo  
 51 Huiramba  
 41 Indaparapeo  
 29 Irimbo  
 2 La Piedad  
 50 Lagunillas  
 26 Maravatío  
 38 Morelia  
 44 Nahuatzen  
 3 Numarán  
 10 Panindícuaro  
 43 Paracho  
 49 Pátzcuaro  
 8 Penjamillo  
 15 Purépero  
 11 Puruándiro  
 42 Queréndaro  
 37 Quiroga  
 23 Santa Ana Maya  
 52 Santa Clara del Cobre  
 30 Senguio  
 4 Sixto Verduzco  
 14 Tangancícuaro  
 39 Tarímbaro  
 46 Tingambato  
 31 Tlalpujahuá  
 13 Tlazazalca  
 48 Tzintzuntzan  
 45 Uruapan  
 16 Villa Jiménez  
 17 Villa Morelos  
 1 Yurécuaro  
 35 Zacapu  
 12 Zamora  
 7 Zináparo  
 25 Zinapécuaro



## FASCÍCULOS PUBLICADOS

1. Papaveraceae. G. Calderón de Rzedowski.
2. Cistaceae. G. Calderón de Rzedowski.
3. Burseraceae. J. Rzedowski y F. Guevara-Féfer.
4. Taxodiaceae. E. Carranza.
5. Coriariaceae. G. Calderón de Rzedowski.
6. Linaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
7. Loasaceae. G. Calderón de Rzedowski.
8. Cornaceae. Eleazar Carranza G.
9. Taxaceae. S. Zamudio.
10. Melastomataceae. F. Almeda.
11. Meliaceae. G. Calderón de Rzedowski y M. T. Germán.
12. Osmundaceae. M. Palacios-Rios.
13. Marattiaceae. M. Palacio-Rios.
14. Hymenophyllaceae. L. Pacheco.
15. Dipsacaceae. G. Calderón de Rzedowski.
16. Malvaceae. P. A. Fryxell.
17. Caricaceae. G. Calderón de Rzedowski y J. A. Lomelí.
18. Zingiberaceae. A. P. Vovides.
19. Symplocaceae. H. Díaz-Barriga.
20. Araliaceae. A. R. López.
21. Styracaceae. E. Carranza.
22. Bignoniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
23. Platanaceae. E. Carranza.
24. Lythraceae. S. A. Graham.
25. Lophosoriaceae. M. Palacios-Rios.
26. Smilacaceae. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski.
27. Buxaceae. R. Fernández Nava.
28. Cochlospermaceae. G. Calderón de Rzedowski.
29. Cupressaceae. S. Zamudio y E. Carranza.
30. Zygothylaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
31. Violaceae. H. E. Ballard, Jr.
32. Compositae. Tribu Cardueae. E. García y S D. Koch.
33. Polemoniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
34. Olacaceae. G. Calderón de Rzedowski.
35. Resedaceae. G. Calderón de Rzedowski.
36. Fouquieriaceae. S. Zamudio.
37. Salicaceae. E. Carranza.
38. Compositae. Tribu Vernonieae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
39. Betulaceae. E Carranza y X. Madrigal Sánchez.
40. Geraniaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
41. Flacourtiaceae. G. Calderón de Rzedowski.
42. Saururaceae. G. Calderón de Rzedowski.
43. Rhamnaceae. R. Fernández Nava.
44. Plumbaginaceae. G. Calderón de Rzedowski.
45. Guttiferae. C. Rodríguez.
46. Eriocaulaceae. G. Calderón de Rzedowski.
47. Clethraceae. L. M. González-Villarreal.
48. Connaraceae. G. Calderón de Rzedowski.
49. Garryaceae. E. Carranza.
50. Lennoaceae. G. Calderon de Rzedowski.
51. Leguminosae. Subfamilia Caesalpinioideae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.

### Complementarios

- I. Presentación. Guía para los autores y normas editoriales.
- II. Listado florístico preliminar del estado de Querétaro. E. Argüelles, R. Fernández y S. Zamudio.
- III. Listado preliminar de especies de pteridofitas de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. H. Díaz Barriga y M. Palacios-Rios.
- IV. Estudio florístico de la Cuenca del Río Chiquito de Morelia, Michoacán, México. C. Medina y L. S. Rodríguez.
- V. Lista de la flora espontánea del jardín botánico "El Charco del Ingenio", San Miguel de Allende, Guanajuato (México). W. L. Meagher.
- VI. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección I (Gymnospermae; Angiospermae: Acanthaceae-Commelinaceae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- VII. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección II (Angiospermae: Compositae). J. Espinosa Garduño y L. S. Rodríguez Jiménez.
- VIII. Végétation du nord-ouest du Michoacán, Mexique. J.-N. Labat.
- IX. Los pastizales calcíficos del estado de Guanajuato. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
- X. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección III (Angiospermae: Connaraceae-Myrtaceae excepto Fagaceae, Gramineae, Krameriaceae y Leguminosae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- XI. A preliminary checklist of the mosses of Guanajuato, Mexico. C. Delgadillo M. y A. Cárdenas S.
- XII. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección IV (Angiospermae: Fagaceae, Gramineae, Krameriaceae, Leguminosae). J. Espinosa Garduño y L. S. Rodríguez Jiménez.
- XIII. Flora y vegetación de la Cuenca del Lago de Zirahuén, Michoacán, México. E. Pérez-Calix.
- XIV. Nota sobre la vegetación y la flora del noreste del estado de Guanajuato. J. Rzedowski, G. Calderón de Rzedowski y R. Galván.
- XV. Listado florístico del estado de Michoacán. Sección V (Angiospermae: Najadaceae-Zygothylaceae). L. S. Rodríguez Jiménez y J. Espinosa Garduño.
- XVI. Elizabeth Argüelles, destacada colectora botánica de Querétaro. G. Calderón de Rzedowski y J. Rzedowski.